

**II CONGRESO**  
*Internacional* de

**ENFERMERÍA**

9 - 10 y 11 <sup>de</sup> **MAYO**  
Santa Elena - Ecuador



---


VIOLENCIA EN LA MUJER EMBARAZADA COMO FACTOR DE RIESGO PARA EL  
PARTO PREMATURO

MSC. LETICIA DA COSTA LEITES

# Violencia de género en el mundo

**1 in 3 women**

throughout the world will experience physical and/or sexual violence by a partner or sexual violence by a non-partner




All statistics can be found in the report entitled Global and regional estimates of violence against women: Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence, by the World Health Organization, the London School of Hygiene & Tropical Medicine, and the South African Medical Research Council, found here:

<http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/en/index.html>

# Ecuador

## Gráfico 6

Porcentaje de mujeres que han sufrido violencia de género por parte de su pareja o ex pareja, por tipo de agresión




Fuente: INEC, Encuesta de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, 2011

Elaboración: Gloria Camacho y Cynthia Mendoza

6 de cada 10 mujeres sufren Violencia de género

## Mapa 1

Mujeres que han sufrido violencia de género (física, psicológica, sexual, patrimonial) de su pareja



Fuente: INEC, Encuesta de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, 2011

Elaboración: Unidad de Información Socio Ambiental UASB y CEPLAES

Las provincias con mayor porcentaje de violencia son: Morona Santiago, Tungurahua, Pichincha, Pastaza y Azuay

Las provincias con menor porcentaje de violencia son: Orellana, Manabí y Santa Elena

## Cuadro 8

### Efectos físicos de las agresiones sufridas por las mujeres por parte de su pareja actual (Número y porcentaje)

Efectos físicos	Número de casos*	Porcentaje sobre el total de mujeres
Tuvo que operarse	70.694	3,4
Tuvo moretones o hinchazón	835.983	39,6
Tuvo cortadas, quemaduras o pérdida de dientes	121.178	5,7
Tuvo hemorragias o sangrado	242.808	11,5
Tuvo fracturas	123.243	5,8
Tuvo un aborto o parto prematuro	126.176	6,0
Tuvo desmayos	222.072	10,5
No pudo mover alguna parte de su cuerpo	245.019	11,6
Tuvo algún familiar que resultó lesionado	63.443	3,0
Tuvo algún miembro del hogar que falleció	26.494	1,3
Otro	32.155	1,5
Total de mujeres consultadas	1.898.797	100,0
<b>Total de respuestas</b>	<b>2.109.265</b>	

Fuente: INEC, Encuesta de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, 2011

Elaboración: Gloria Camacho y Cynthia Mendoza

\*Los valores han sido inferidos en la encuesta por factores de expansión, y son aproximados. El margen de error para el cálculo de la media es de 0,75% con un nivel de significación del 95%.

La maternidad es un factor que puede desencadenar violencia: el 14,5% de las mujeres relatan que la violencia comenzó o empeoró con el nacimiento de un hijo/a



# VIOLENCIA EN LA MUJER EMBARAZADA COMO FACTOR DE RIESGO PARA EL PARTO PREMATURO

---

**Objetivo:** Evaluar el riesgo de parto prematuro en mujeres embarazadas **uruguayas** que hayan declarado sufrir violencia durante el año 2012, registradas en el Sistema Informático Perinatal

**Población objetivo:** 43.989 mujeres embarazadas registradas en el Sistema Informático Perinatal de **Uruguay** en el año 2012

**Variables de estudio:** Violencia y Prematurez



# ¿Por qué la violencia en la mujer embarazada es factor de riesgo para el parto prematuro?

---


Violencia como situación de estrés



Niveles alterados de oxitocina, cortisol en sangre



Aumenta las sustancias vasoactivas que provocan la constricción en los vasos placentarios



Restricción del crecimiento fetal, DPPNI, trabajo de parto prematuro



## Estudios científicos que relacionan la violencia en la mujer embarazada y la prematuridad

---


- ✓ Las mujeres que han sufrido violencia de pareja tuvieron 1.16 veces riesgo de tener parto prematuro. *OMS;2013*
- ✓ El 27,5% de las mujeres embarazadas que sufrieron violencia, tuvieron parto prematuro. *Han A y Sterwat D. La violencia en la mujer embarazada y los resultados perinatales en América Latina y el Caribe. Am J Obstet Gynecol. 2014*



# Resultados

Sólo el 1,3% (535) de las mujeres embarazadas relataron situaciones de violencia. Esta proporción disminuyó en las que tuvieron parto a término (1,2%) y aumentó en las que tuvieron de pre término (1,8%)  
 $p < 0,001$

Violencia en el embarazo



Qué características presentaron los hijos de las mujeres que padecieron violencia durante la gestación?

---





Variables	Violencia (%)	No violencia (%)	Significancia
Prematurez	18,8	8,8	<0,001
Bajo peso al nacer	12,3	6,7	0,003
PC al nacer deficiente	19,5	11,9	0,002
Longitud al nacer deficiente	10,3	5,6	0,006



# Conclusión

---

- ❖ A través de los resultados obtenidos, se puede afirmar que las mujeres que sufren violencia durante el embarazo tienen probabilidad de parto prematuro, en un 19% aproximadamente.



# Recomendaciones para disminuir y prevenir la violencia de género

---

- ❖ Detectar la violencia en forma oportuna y adecuada
- ❖ Realizar investigaciones similares a nivel nacional y regional en Ecuador
- ❖ Promover el reconocimiento de la violencia contra las mujeres como un problema de salud pública

“El respeto como forma de vida, es el único que podrá cambiar el futuro de nuestras vidas y de nuestra sociedad”



**Muchas gracias!**